

**Информированное добровольное согласие  
на проведение местной анестезии в ГБУЗ «ДСП № 45 ДЗМ»**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Я, \_\_\_\_\_

Законный представитель Пациента \_\_\_\_\_,

врачом \_\_\_\_\_ проинформирован(а)

о необходимости применения местной анестезии.

Местная (аппликационная и/или инфильтрационная, и/или проводниковая, и/или сочетанная) анестезия имеет своей целью обезболить медицинские манипуляции. Местная инъекционная анестезия проводится в области выполняемой манипуляции и предусматривает одну или несколько инъекций (уколов) для введения анестезирующего вещества с целью обеспечения эффекта обезболивания.

Последствиями отказа от данной процедуры могут быть: невозможность выполнения медицинской манипуляции, прогрессирование заболевания, развитие инфекционных осложнений, появление болевых ощущений, а также обострение системных заболеваний организма.

Мне разъяснено, что применение местной анестезии может привести к аллергическим реакциям организма на медикаментозные препараты, обмороку, коллапсу, шоку, травматизации нервных окончаний и сосудов, проявляющимися потерей чувствительности, невритами, невралгиями и постинъекционными гематомами.

Я информирован(а) также об основных преимуществах, сложностях и риске инъекционной анестезии, включая вероятность осложнений.

Основные осложнения инъекционной анестезии обусловлены, в первую очередь, введением в ткани организма специального раствора и реакцией организма на него (учащение сердцебиения, повышение артериального давления, аллергический шок, обморок, коллапс). Введение раствора проводится при помощи иглы, что травмирует мягкие ткани и может вызвать образование внутреннего кровотечения и гематомы, отечность десны в области инъекции, тризм (ограниченное открывание рта), которые могут сохраняться в течение нескольких дней или дольше.

Мне разъяснена необходимость применения местной анестезии для обезболивания. Местная анестезия проводится анестетиком \_\_\_\_\_ в области выполняемой манипуляции и предусматривает одну или несколько инъекций (уколов) с использованием одноразовых игл и карпул. Длительность эффекта может варьироваться от 15 мин. до нескольких часов в зависимости от вида анестетика и индивидуальной восприимчивости организма и проявляется в потере чувствительности в области обезболивания и временном ощущении припухлости, в связи с чем, необходимо исключить травмирование (накусывание) мягких тканей (губ, щек, языка) в период потери чувствительности.

Обезболивание затруднено при выраженном стрессе, в области существующего воспаления, в области моляров нижней челюсти, после употребления алкогольных или наркотических веществ.

При этом я информирован(а), что в ряде конкретных случаях медицинское вмешательство без анестезии невозможно. Альтернативой является отказ от лечения.

Современные анестетики обычно не дают осложнений. Однако при наличии опасений рекомендуется провести предварительные пробы на совместимость.

